

segmentos del abdomen el ejemplar allotipo lleva una cerda discal en cada segmento, aislada, sola, y evidentemente anormal.

Holotipo: ♂, El Canelo, provincia de Santiago, noviembre 20, 1950; J. Herrera coll., CNI.

Alotipo: ♀, Illapel, provincia de Coquimbo, septiembre 16-17, 1951; E. W. Zomosa coll., CNI.

Paratipo: ♂, con los mismos datos, fecha y colector del holotipo, CNI.

Localidad-tipo: El Canelo, provincia de Santiago, Chile. Huésped desconocido.

ALGUNOS LEPIDÓPTEROS ROPALÓCEROS DE TARAPACA (9-X-1951)

Doy a continuación una lista de algunos Lepidópteros ropalóceros colectados en la reciente expedición que efectué a la provincia de Tarapacá:

Tatochila microdice wagenknechti Ureta.—Esta subespecie ha sido colectada desde Antofagasta al sur. La he hallado en Parca a 2.600 m. (20°02'; 69°13') a principios de octubre.

Tatochila blanchardi Butler ssp.—Esta mariposa vuela en abundancia en las plazas del puerto de Iquique, donde la capturé los primeros días de septiembre; también he cogido algunos ejemplares en Mamiña a 2.700 m. durante el mismo mes.

Teriotolias atinas kuscheli Ureta.—Vuela en Mamiña y en Parca en el mes de octubre: es bastante rara. Se ha colectado en la Cordillera de Arica (Putre).

Dione vanillae Linneo.—Sólo un único ejemplar he colectado en Parca a 2.600 m. el día 30 de septiembre. No había sido dada para nuestra fauna.

Cosmosatyrus chiliensis sajama Weymer.—Muy rara, vuela entre el poblado de Cancosa (19°52'; 68°37') y el lugar denominado Lupe Chico (19°52'; 68°45'), entre los 4.000 y 4.300 m. La zona de vuelo en que capturé esta especie es una pampa de unos 15 kilómetros de extensión y cuyas agüas se dirigen hacia el altiplano boliviano. La colecta tuvo lugar el día 27 de septiembre.

Thecla dissentanea Draudt.—Ha sido colectada en Putre; ahora he colectado algunos ejemplares de Noasa (19°59'; 69°08'), a 3.400 m. volando sobre alfalfa (*Medicago sativa*, L.).

Todos los ejemplares colectados están depositados en la colección Barros Valenzuela. (Luis E. Peña)