

PIERIDAE: *Hypsochila huemul* Peña.

Especie conocida sólo de la localidad del tipo (Chile Chico, provincia de Aisén), ha sido colectada en grandes cantidades en la cordillera de Las Raíces al oeste de Lonquimay, en la Provincia de Malleco el 28 de diciembre de 1967. También se ha encontrado un ejemplar hembra de esta especie en la cordillera de Bío-Bío al sur de la Laguna del Laja el 19 de febrero de 1956.

Es interesante hacer notar que en el ambiente en que se han encontrado estas tres poblaciones, corresponde a regiones altas de la Patagonia, que se extiende en las zonas antes indicada región Estepa Patagónica, Peña 1966, Rev. Univ. L-LI, II: 209-219; 1966. "Postilla" Peab. Mus. 97: 1-17. Al parecer *Hypsochila*, vuela con mayor abundancia entre los meses de agosto y diciembre, pues así lo comprueban las colectas efectuadas como a continuación se expresa:

H. peñai Ureta: diciembre, no se ha encontrado en otros meses.

H. sulfurodice Ureta: abundante en diciembre y en abril (cordillera de Antofagasta, Co. Quimal), esta última fecha corresponde a la segunda primavera que ocurre en estas áreas del norte del país y que se produce por efectos de las lluvias estivales que avanzan desde las zonas tropicales.

H. wagenknechti Ureta: abundante en agosto (cordillera de Santiago), se encuentra hasta enero y aun en febrero, pero bastante escasa.

H. huemul Peña: diciembre en abundancia en Lonquimay, cordillera de Las Raíces y en la cordillera de Aisén, Chile Chico.

H. galactodice Ureta: no ha sido localizada por nosotros, el tipo fue colectado en enero.

H. argyrodice Staudinger: abundante en octubre.

Distribución.

La distribución de las especies del género *Hypsochila*, en Chile, sería hasta el momento:

H. sulfurodice: Tarapacá y Antofagasta, 2.800/3.200 m.

H. peñai: Antofagasta, 4.600/5.200 m.

H. wagenknechti: Coquimbo y Linares, 1.800/2.400 m.

H. galactodice: Ñuble, 2.000 m.?

H. huemul: Ñuble, Malleco, 1.400 m. y Aisén, 230 m.

H. argyrodice: Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, 20/50 m.

Gran parte del material estudiado está depositado en la colección del autor y en la colección de la Estación Experimental Agronómica de la Universidad de Chile.

DANAIDAE: *Diogas erippus* (Cramer).

Esta especie migratoria generalmente es colectada en Tarapacá y como visitante ocasional de los valles de Atacama y Coquimbo. Existe además un ejemplar procedente de Talca. Ahora ha sido colectada en la región esteparia de la provincia de Malleco en el nacimiento del río Bío-Bío, en la localidad de Marimenuco (diciembre, 1965). Seguramente se trata de un ejemplar extrañado de las masas migratorias que penetran a los valles cálidos de la zona central.

L. E. PEÑA G.
FEBR. 1968.

Distribución geográfica del género Hypsochila

